

Check-Liste Varroabehandlung Nassenheider Rähmchenverdunster - Hauptentmilbung

- 1.) **Wann:** **Letzter** Termin für den Behandlungsbeginn ist der **31. Juli** des laufenden Jahres.
- 2.) **Wer:** Möglichst **alle Imker im Umkreis** zur **selben Zeit!**
- 3.) **Reihenfolge der Tätigkeiten:**
 - a.) Honig abnehmen
 - b.) Volk für Überwinterung und Behandlung sortieren d.h. 2 Raumüberwinterung, möglichst alle Brutwaben (8 Stück + li + re eine Pollenwabe) in die erste Zarge, aufsetzen mit ausgeschleuderten Waben und Restbrut – **noch am selben Tag füttern!** (4 Liter Zuckerwasser 3:2), in den nächsten Tagen nochmals mindestens 4 Liter ZW, Flugloch **so klein wie möglich** machen! Stand möglichst in 1-2 Tagen abarbeiten!
 - c.) Nach Futterabnahme aller Völker sofort mit der Behandlung beginnen!
 - d.) Flugloch voll aufmachen, **AS gut kühlen** aber nicht einfrieren und mit Kühltasche samt Kühlbeutel zum Stand! – Nassenheider Rähmchenverdunster mit 200 ml 85%-ige AS füllen und immer **neuen originalen großen Docht** verwenden (Ableger und kleine Völker wie Mini Plus kleiner Docht) und **mittig** in die 2. Zarge hängen!
 - e.) Am 7. oder 8. Tag Kontrolle ob noch AS zur Verdunstung vorhanden ist, ansonsten **sofort nachfüllen! (100 ml) – Wichtig: eine Verdunstung muss 14 Tage garantiert sein!!!**
 - f.) Nach 14 Tagen Behandlung Nassenheider entnehmen und weiter füttern (12 bis 16 Liter ZW 3:2) – Nicht vergessen Flugloch wieder **so klein wie möglich** zu machen!

Check-Liste Varroabehandlung Restentmilbung mit Oxalsäure-Träufelverfahren

- 1.) **Wann:** Ende November - Anfang Dezember je nach Außentemperatur und Brutfreiheit!
- 2.) **Voraussetzung:** Völker müssen **brutfrei** sein!
- 3.) **Reihenfolge der Tätigkeiten:**
 - a.) Oxalsäure mit heißen Wasser auf Handtemperatur erwärmen (Kühltasche)
 - b.) 2. Einheit von hinten kurz aufkippen – am besten zu zweit arbeiten.
 - c.) Oxalsäure über alle besetzten Wabengassen der Wintertraube träufeln (bis 50 ml bei starken Wintervolk)
 - d.) Volk sofort wieder schließen – fertig
 - e.) **Achtung:** wirklich gute Wirkung nur gegeben, wenn Bienen eng beisammen sitzen d.h. wenn sie in der Wintertraube sind! – im Gegensatz zur Verdampfungsmethode!